

Colpofix® Stimulates your natural defenses



CARBOXYLMETHYL BETAGLUCAN
POLYCARBOPHIL

Colpofix®
קולפופיקס

Vaginal spray gel תרסיס גל וגינלי

לטיפול וגינלי המבוסס על
באזי המעביר את רמת הטיפול וגינלי
כולל שנייה הגורמת עקב זיהום וירוס HPV



זיהום מתמשך בוירוס הפילומה (HPV) הוכר ע"י ארגון הבריאות העולמי כגורם הסיכון העיקרי להתפתחות סרטן צוואר הרחם.

ההידבקות בוירוס הפילומה עלולה לגרום לשינוי פתולוגי בצוואר הרחם, אשר עשוי להחלים ספונטנית או להמשיך

ולעבור שלושה שלבים של החמרה עד התפתחות סרטן צוואר הרחם.

האבחון כולל משטח פאפ ספציפי ל-HPV,

קולפוסקופיה ובמקרה הצורך ביופסיה.

עד היום, עקב הסיכוי להתגברות גוף האישה על הנגע, היה מקובל להמתין חצי שנה לאחר איבחון נשאות HPV מהזנים המסוכנים (16,18) ושינוי בצוואר הרחם בשלב הראשון - CIN₁. לאחר מכן, לבצע בדיקה חוזרת כדי לבדוק אם הייתה החלמה עצמונית או שהשינוי הצווארי ממשיך להחמיר.

הטיפולים למניעת סרטן צוואר הרחם התחילו רק מהשלב השני וכללו חיתוך או צריבה של האיזור הנגוע.

לאחר הצלחה במחקרים בעולם, הגיע לארץ התכשיר קולפופיקס המכיל ספריי-ג'ל עם החומר הפעיל BETA GLUCAN מיועד לנשים שאובחנו עם נגיף HPV ובבירור מצב צוואר הרחם נמצאות בשלב שינוי צווארי CIN₁.

מטרת השימוש בקולפופיקס היא:

1. לעורר את מערכת החיסון של המטופלת בעזרת שיפעול

תאים פרו-אינפלמטוריים מסוג לימפוציטים NK ו-T

2. להעלות את כמות הלקטובצילים בנרתיק


3. להוריד את ה-pH באזור צוואר הרחם

בכך, קולפופיקס מזרז את הבראת רירית צוואר הרחם שעברה

שינוי פתולוגי כתוצאה מפעילות HPV.

מחקרים הראו כי שיעורי ההחלמה גבוהים יותר משמעותית אצל

מטופלות לאחר הבחנה של CIN1 לעומת נשים שלא טופלו.



אין לנער את המוצר | יש לבצע את הטיפול בערב, לפני השינה

1. הסירי את עטיפת המגן מהמוליך.

2. חברי את המוליך אל פיית ההתזה של מיכל התרסיס

3. לחצי על הפיה מספר פעמים עד להופעת החומר.

4. בשכיבה על הגב בכיפוף ברכיים, החדירי את המוליך עמוק לתוך הנרתיק ורססי 5 פעמים.

5. השליכי את המוליך לאחר השימוש

6. החזירי את מכסה מיכל התרסיס

מינון מומלץ: בצעי מתן אחד (5 התזות) ליום, בערב לפני השינה,

למשך 20 ימים רצופים בחודש, למשך שלושה חודשים.



לפרטים נוספים 02-5870875